



緑地管理用除草剤

コロレートS 粒剤

撒くだけで 竹・ササ も枯らせえます!!

無散布区：竹の地下部の状況




散布区：竹の地下部の状況

(地下茎の変色・根の壊死)



家周り・空き地の 雑草防除の定番!!



スマホで QR コード読み取り

詳しくは
コチラ

Vegrass
ヴェグラス

<https://www.sdsbio.co.jp/vegrass/index.html>



株式会社 **イセー・イセー バイオテック**



道路・宅地周りの竹防除、駐車場、水稲刈取り跡の雑草防除に!

農林水産省登録 第11912号

クロレートS 粒剤

包装 クロレートS 5kg × 4袋

有効成分：塩素酸ナトリウム …… 50.0%

竹 防除のポイント

効果が高く、発現も早い!
地下茎を伸長させない!

春季処理が最適です!

補足：春処理ができなかった場合は秋処理をお勧めします。

【散布時期の例】 竹の種類、生育地域やその年の気候によってタケノコの発生時期は異なります。ご注意ください。

竹の種類	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
モウソウチクの場合	芽子の成長期 (地中)		タケノコの 発生時期		地下茎の伸長時期				芽子の成長期 (地中)			
	処理最適期				秋の処理時期							
マダケの場合	芽子の成長期 (地中)			タケノコの 発生時期		地下茎の伸長時期			芽子の成長期 (地中)			
	処理最適期				秋の処理時期							

※1：竹の生態については内村悦三氏資料より引用

【適用雑草と使用方法】(抜粋)

作物名	適用場所 使用目的	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む 農薬の総使用回数
樹木等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面等	一年生及び 多年生雑草	雑草生育 初期～中期	15～25kg/10a	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回以内 （全面土壌散布は 1回以内、但し 当該処理をする 場合には雑草茎葉 散布は1回以内）
		ササ類	雑草生育期	45～60kg/10a	1回	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	
		竹類	竹類生育期				
		スギナ	秋冬期	30～40kg/10a			

注意点

- 急斜面での散布はさける
- 効果の発現には時間と適度の土壌水分が必要
- 周辺の有用植物の植栽地に流入または飛散しないように注意
- 有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける
- 竹は立ち枯れすると、倒れやすくなるので注意
- 夏期は薬剤の吸収が進まず効果が劣る可能性があるので使用をさける

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は園場などに放置せず、適切に処理してください。

この印刷物の記載内容は 2025 年 10 月現在のものです。

2025.10(MI)

〈製造〉

株式会社 **イスター・イース バイオテック**

〈販売〉

丸善薬品産業株式会社